

Hoe kan baarmoederhalskanker voorkomen worden?

Het HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker probeert de ziekte te voorkomen.

HPV staat voor Humaan Papilloma Virus. Er bestaan veel types HPV. Sommige hiervan kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. Maar ze veroorzaken ook andere kankers, zoals keelkanker – ook bij mannen.

De kans op baarmoederhalskanker vermindert als u voor uw eerste seksuele contact laat vaccineren met een HPV vaccin.

Wat zijn de nadelen van baarmoederkanker opsporing?

Het uitstrijkje zelf wordt door veel vrouwen als niet heel leuk ervaren.

Een slecht resultaat van het uitstrijkje kan ongerustheid veroorzaken en tot bijkomende onderzoeken leiden.

Een slecht resultaat van een uitstrijkje kan later toch geen kanker blijken te zijn. In dat geval is verder onderzoek niet nodig.

De uitslag van het uitstrijkje kan ook normaal zijn terwijl u toch kanker hebt.

Behandelingen voor een voorstadium van baarmoederhalskanker kunnen een negatief effect hebben op latere zwangerschappen.

Het Wijkpraktijkteam

Huisartsen



Dr. Ann Van Den Bruel
Dr. Katrien Cordemans
Dr. Joke Versmissen (HAIO)
Dr. Bram Spinnewijn
Dr. Pieter Provinciael (HAIO)

Praktijkverpleegkundigen



Simonne Neefs
Karima Gariji

Psycholoog



Jan Piers

Praktijkassistentes



Liesbeth Jespers Sarah Van Camp



DE
WIJKPRAKTIJK

Baarmoederhals
kanker
opsporing

Paleisstraat 104
2018 Antwerpen
www.dewijkpraktijk.be
03/369.39.99

Advies opsporing Baarmoederhalskanker:

Wat is baarmoederhalskanker?

Baarmoederhalskanker, ook wel cervixkanker genoemd, is een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de baarmoederhals.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV) dat wordt overgedragen door seksueel contact. Bij sommige veroorzaakt dit virus letsel die kunnen veranderen in kanker wanneer ze niet behandeld worden.

Hoe kan je baarmoederhalskanker opsporen?

Baarmoederhalskanker kan opgespoord worden door middel van een uitstrijkje.

De arts neemt met een staafje wat cellen uit de baarmoederhals en laat deze onderzoeken in het labo. Indien sommige cellen er anders uitzien dan normaal, dan kan dat op een voorstadium of een vroeg stadium van baarmoederhalskanker wijzen.

Het uitstrijkje:

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitstrijkje?

Bent u tussen de 25 en 64 jaar oud, dan komt u in aanmerking.

U kan hiervoor een afspraak maken bij uw jouw huisarts. Ook voor meer uitleg kan u altijd terecht bij uw huisarts.



Bij de meeste vrouwen moet er maar 1 keer om de 3 jaar een uitstrijkje gemaakt worden.

Wordt er iets gevonden wat wijst op een voorstadium of vroeg stadium van baarmoederhalskanker, dan kan dit een reden zijn om dit verder te laten onderzoeken bij de gynaecoloog of om een nieuw uitstrijkje te laten nemen op een later tijdstip.

Wanneer is een uitstrijkje niet nodig?

- Als u baarmoederhalskanker hebt of had.
- Als uw baarmoeder en baarmoederhals zijn verwijderd. Indien alleen je baarmoeder is verwijderd (hysterectomie), blijft een uitstrijkje aangewezen.

Twijfelt u? Contacteer dan uw huisarts voor meer informatie.

Wanneer kan u best een uitstrijkje uitstellen?

- Als u zwanger bent
- Net bevallen bent
- Borstvoeding geeft

U stelt het onderzoek best uit tot 6 maanden na de bevalling. Tijdens de zwangerschap ondergaat de baarmoederhals immers enkele veranderingen.

Ook wanneer u last hebt van een vaginale infectie, bloed- of slijmverlies. Laat je u best hiervoor eerst behandelen alvorens u te laten onderzoeken op baarmoederhalskanker.